

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 22-6-77 114823

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 99 - 21 Juin 1977

V I G N E

MILDIU : De nouvelles sorties de taches sont observées dans le vignoble ; elles font suite à des contaminations dues aux pluies de la période du 7 au 10 juin.

Le vignoble traité entre le 15 et le 20 juin était normalement protégé mais nous rappelons que la vigne est particulièrement sensible au mildiou pendant la floraison et que la nouvelle série de pluies devra être suivie du renouvellement des applications fongicides dès que possible.

OIDIUM : Ajouter un soufre à la bouillie anti-mildiou.

ARBRES FRUITIERS

MOUCHE DE LA CERISE : Depuis quelques jours des mouches de la cerise sont régulièrement capturées dans des cerisiers dont les fruits ont une destination industrielle.

Les variétés tardives habituellement infestées doivent être protégées lorsque les fruits passent au rose.

ARBUSTES A PETITS FRUITS

OIDIUM SUR CASSISSIER : Le temps perturbé a été très favorable au développement de l'oïdium américain du groseillier sur cassissier et depuis la fin de la semaine on observe une aggravation de la maladie.

Les fongicides à utiliser ont été cités :

- bupirimate (Nimrod)
- ditalimfos (Laptran 20 EC)
- dinocap (Karathane, Crotthane, Sovicap) auquel on ajoutera un mouillant.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIU DE L'OIGNON : Dans notre dernier bulletin (n° 98 du 15 juin) une erreur s'est produite par suite d'une inversion entre "pourriture grise des fraises" et "mildiou de l'oignon".

En ce qui concerne cette dernière maladie il faut lire : "à l'aide d'un fongicide : mancozèbe, manèbe, oxychlorure de cuivre ou propinèbe." Revoir notre bulletin n° 91 du 5 mai".

HOUBLON

MILDIU : L'importance du mildiou est très variable selon les houblonnières. La végétation étant active le renouvellement du traitement fongicide s'impose.

PUCERONS : Les colonies étant parfois importantes, un produit aphicide devra être ajouté au traitement mildiou.

P23

CEREALES

PUCERONS : Depuis notre dernier bulletin les foyers de pucerons se sont développés régulièrement et l'on rencontre d'assez nombreuses parcelles infestées heureusement sans gravité la plupart du temps. Nous avons déjà donné des informations sur les traitements dans nos bulletins du 12 mai, 7 et 15 juin mais il faut également rappeler que les pucerons quittent les céréales quand les grains arrivent au stade pâteux et que pratiquement il est inutile de lutter contre ces ravageurs à partir du moment où l'amarante devient laiteuse.

ROUILLE JAUNE : Le développement de la rouille jaune est lent jusqu'à ce jour. Toutefois l'extension de quelques foyers est observée depuis peu dans le Nord de l'Yonne sur blé d'hiver : variétés Joss, Ducat, Talent et même Eloï.

GRANDES CULTURES

ANTHRACNOSE DU POIS : La maladie est aisément reconnaissable, les feuilles sont parsemées de taches irrégulières presque circulaires, gris clair, auréolées de pourpre et virant au brun.

Utiliser un fongicide préventif comme le manèbe à raison de 200 g. de matière active par hectolitre ou bénomyl, carbendazime, etc... à 40 g. de matière active par hectolitre.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

Inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse 527AD.